

**DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  
SUBSISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - MORTALIDAD EVITABLE  
MUERTE MATERNA SE 1 A LA SE 47  
ECUADOR 2016**

**DEFINICIONES OPERACIONALES**

**Defunción Materna:** se define como la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo independientemente de la duración y el sitio del embarazo debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo su atención, pero no por causas accidentales e incidentales.

**Defunción materna tardía:** es la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas después de los 42 días pero antes de un año de la terminación del embarazo.

**Razón de Muerte Materna (RMM):** es el número de muertes maternas (dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo) multiplicado por 100.000 nacimientos estimados en determinado espacio geográfico, en un período considerado.

**Defunciones obstétricas Directas:** son las que resultan de complicaciones obstétricas del estado gravídico (embarazo, trabajo de parto, y puerperio), de intervenciones, de omisiones, de tratamientos incorrectos, o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas.


**Defunciones obstétricas Indirectas:** son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debida a causa obstétrica directa pero si agravadas por los efectos fisiológicos propios del embarazo.

**LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA REPORTA LAS MUERTES MATERNAS OCURRIDAS DESDE LA SE 1 A LA SE 47 DEL AÑO 2016 CON 123 CASOS, DISTRIBUIDOS EN 17 PROVINCIAS DEL ECUADOR.**

**Número de Muertes Maternas por zona y provincia de fallecimiento SE 1 a la SE 47**

Zona Fallecimiento	Provincia de fallecimiento	SE 1 a SE 46	SE 47	Total general
ZONA 1	CARCHI	1		1
	IMBABURA	3		3
	ESMERALDAS	11		11
ZONA 2	ORELLANA	1		1
	PICHINCHA	1		1
ZONA 3	CHIMBORAZO	2		2
	COTOPAXI	3		3
	TUNGURAHUA	6		6
ZONA 4	SANTO DOMINGO	4		4
	MANABI	11		11
ZONA 5	SANTA ELENA	2		2
	BOLIVAR	3		3
	GUAYAS	4		4
ZONA 6	MORONA	4		4
	AZUAY	7		7
ZONA 7	LOJA	3		3
	EL ORO	8		8
ZONA 8	GUAYAS	32	3	35
	PICHINCHA	14		14
Total general		120	3	123


**Número de Muertes Maternas por provincia de fallecimiento SE 1 a la SE 47**



**En la SE 47 se notifica tres casos de MM en la provincia del Guayas, y se notifica 5 casos encontrados en la Búsqueda Activa correspondiente a las provincias de: Guayas SE 13, 17 y 20, El Oro SE 8 y Manabi SE 16.**

**De los 123 casos notificados hasta la SE 47, la Zona 8 registra el mayor porcentaje de casos de MM 28,23% (35 casos) del total de casos, seguida de las Zona 1 y 4 con un porcentaje de 12,10% (15 casos cada una), y de la Zona 9 con un porcentaje de 11,29% (con 14 casos).**


**Porcentaje de casos de MM por Zonas de fallecimiento SE 1 a la SE 47**



### Número de Muertes Maternas por zona y provincia de residencia SE 1 a la SE 47

Zona de Residencia	Provincia de residencia	SE 1 a SE 46	SE 47	Total general
ZONA 1	CARCHI	1		1
	ESMERALDA..	13		13
	IMBABURA	3		3
ZONA 2	ORELLANA	1		1
	PICHINCHA	2		2
ZONA 3	CHIMBORAZO	3		3
	COTOPAXI	5		5
	TUNGURAH..	5		5
ZONA 4	MANABI	15		15
	SANTO DOM..	4		4
ZONA 5	BOLIVAR	2		2
	GUAYAS	5		5
	LOS RIOS	4		4
	SANTA ELENA..	4		4
ZONA 6	AZUAY	7		7
	MORONA	4		4
ZONA 7	EL ORO	8		8
	LOJA	3		3
	ZAMORA	1		1
ZONA 8	GUAYAS	20	3	23
ZONA 9	PICHINCHA	10		10
Total general		120	3	123

### Número de Muertes Maternas por provincia de residencia SE 1 a la SE 47



Las Muertes Maternas con residencia en la provincia del Guayas representan el porcentaje mas alto 18,55% con (23 casos), seguida de la provincia de Manabí con un porcentaje de 12,10% (15 casos)


### Comparación de casos por provincia de fallecimiento y de residencia SE 1 a la SE 47

Provincia de fallecimiento	Provincia de residencia																Total general				
	AZU..	BOLI..	CAR..	CHI..	COT..	EL ORO	ESM..	GUA..	IMB..	LOJA	LOS RIOS	MAN..	MOR..	ORE..	PICH..	SANT A ELE NA		SANT O DO MIN..	TUN..	ZAM..	
AZUAY	7																				7
BOLIVAR		2		1																	3
CARCHI			1																		1
CHIMBORAZ..				2																	2
COTOPAXI					3																3
EL ORO						7				1											8
ESMERALD..							11														11
GUAYAS					1	1		27		4	4					2					39
IMBABURA									3												3
LOJA										2										1	3
MANABI												11									11
MORONA													4								4
ORELLANA														1							1
PICHINCHA					1		2								12						15
SANTA ELENA																2					2
SANTO DOMINGO																	4				4
TUNGURAH..									1										5		6
Total general	7	2	1	3	5	8	13	28	3	3	4	15	4	1	12	4	4	5	1		123

De los 123 casos de Muertes Maternas reportados, los 104 corresponden a la misma provincia en relación a su residencia y fallecimiento. El caso de la provincia de Bolívar su lugar de residencia es Chimborazo, el caso de El Oro su lugar de residencia es Loja, los doce casos de Guayas sus lugares de residencia corresponden: 4 a Los Ríos, 4 a Manabí 2 a Santa Elena, 1 a El Oro y 1 a Cotopaxi, el caso de la provincia de Loja su lugar de residencia es la provincia de Zamora, los 3 casos de la provincia de Pichincha sus lugares de residencia corresponden: 2 a la provincia de Esmeraldas y uno a la provincia de Cotopaxi, el caso de la provincia de Tungurahua su lugar de residencia es Guayas.

DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  
 SUBSISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - MORTALIDAD EVITABLE  
 REPORTE DE MM SE 1 A LA SE 47  
 ECUADOR 2016

**Número de casos de Muertes Maternas por años 2012 al 2016, SE 1 a la SE 47  
 Ecuador 2016**



**NOTA:** En este gráfico se hace referencia a las Muertes Maternas hasta los 42 días de puerperio, que son Muertes Maternas que se toman en cuenta para el cálculo de la RMM al finalizar el año.

Al comparar el 2012 con el 2016 en el mismo período en el 2016 hay una disminución del 40,52% (77 casos de MM)  
 Al comparar el 2013 con el 2016 en el mismo período en el 2016 hay una disminución del 18,12% (25 casos de MM),  
 Al comparar el 2014 con el 2016 en el mismo período en el 2016 hay una disminución del 22,07% (32 casos de MM).  
 Al comparar el 2015 con el 2016 en el mismo período en el 2016 hay una disminución del 19,86% (28 casos de MM).

Los datos de los años 2012 al 2015 son los totales con BA. Los datos del año 2016 son notificaciones sistematicas de los establecimientos de salud, y se ha incluyendo 7 casos encontrados en la primera búsqueda activa.


**Número de Muertes Maternas Tardías por años 2012 al 2016 SE 1 a la SE 47**




**NOTA:** El gráfico hace referencia al número de Muertes Maternas tardías que son las que ocurren después de 42 días de puerperio.

En los años 2012 y 2013 no se reportaron casos de Muertes Maternas Tardías.

## Comparativo de ocurrencia de Muertes Maternas por SE años 2012 al 2016 SE 1 a la SE 47




## Comparación de casos por provincia de residencia, años 2015 y 2016 SE 1 a la SE 47




Guayas hasta la SE 47 del año 2015 reporta (37 casos) de MM, para el año 2016 en el mismo período reporta (28 casos) con una disminución del 29,73% (11 casos), Pichincha en el año 2015 reporta (23 casos) para el año 2016 reporta (12 casos) con una disminución del 39,13% (9 casos), Manabí en el año 2015 reporta (18 casos) en el año 2016 reporta (15) con una disminución del 16,67% (3 casos), Esmeraldas en el año 2015 reporta (15 casos) en el 2016 reporta (13 casos) con una disminución del 13,13% (2 caso), Los Ríos en el 2015 reporta (15 casos) en el 2016 reporta (3 casos) con una disminución del 80% (12 casos).


### Casos de MM por zonas de fallecimiento, causa Directa e Indirecta SE 1 a la SE 47



### Casos de MM por zonas de residencia, causa Directa e Indirecta SE 1 a la SE 47



### Total casos de MM Directa e Indirecta SE 1 a la SE 47




Por zona de fallecimiento y de residencia; las nueve zonas reportan casos de MM Directas e Indirectas. El total de casos de MM de causas obstétricas Directas representan el 65,04% (80 casos) mientras que las causas Indirectas representan el 34,96% (43 casos), hasta la SE 47.

### Trimestre de gestación al momento del fallecimiento vs edad de la madre SE 1 a la SE 47

Edad (grupo)	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Total general
15 a 19 años	3	2	10	15
20 a 24 años	2	6	19	27
25 a 29 años	2	4	17	23
30 a 34 años		3	28	31
35 a 39 años	2	3	15	20
40 a 44 años			5	5
45 y más añ..	1		1	2
Total general	10	18	95	123


En el tercer trimestre del embarazo se aprecia el mayor número de MM en todas las edades.

### Casos de MM por grupos de edad. SE 1 a la SE 47




De los 124 casos de MM reportadas hasta la SE 47, los grupos de edad entre 20 a 34 años, representan el mayor número y porcentaje de MM con 81 casos y un porcentaje de 65,85% del total de casos.

### Porcentaje de casos de MM por tiempo de hospitalización SE 1 a la SE 47




### Casos de MM por tiempo de hospitalización SE 1 a la SE 47

Provincia de fallecimiento	Menos de 48 H	Más de 48 H	NA	Total general
AZUAY	5		2	7
BOLIVAR	1		2	3
CARCHI	1			1
CHIMBORAZO		1	1	2
COTOPAXI	1		2	3
EL ORO	3	4	1	8
ESMERALDAS	7	3	1	11
GUAYAS	24	12	3	39
IMBABURA		2	1	3
LOJA	1	2		3
MANABI	7	3	1	11
MORONA	3		1	4
ORELLANA		1		1
PICHINCHA	7	5	3	15
SANTA ELENA	1	1		2
SANTO DOMINGO	4			4
TUNGURAHUA	2	3	1	6
<b>Total general</b>	<b>67</b>	<b>37</b>	<b>19</b>	<b>123</b>




El mayor porcentaje 54,47% (67 casos) de MM ocurren en menos de 48 horas de permanecer o de haber llegado a los hospitales. El 30,08% (37 casos) fallecen después de permanecer más de 48 horas en los hospitales. El 15,45% (19 casos) no aplica pues son MM ocurridas en el domicilio.

### Porcentaje de casos de MM por ubicación de domicilio SE 1 a la SE 47




### Casos de MM por ubicación de domicilio SE 1 a la SE 47

Provincia de resi..	URBANA	RURAL	Total gen..
AZUAY	4	3	7
BOLIVAR	1	1	2
CARCHI	1		1
CHIMBORAZO	1	2	3
COTOPAXI		5	5
EL ORO	2	6	8
ESMERALDAS	10	3	13
GUAYAS	19	9	28
IMBABURA	3		3
LOJA	1	2	3
LOS RIOS	2	2	4
MANABI	10	5	15
MORONA	1	3	4
ORELLANA	1		1
PICHINCHA	7	5	12
SANTA ELENA	3	1	4
SANTO DOMINGO	3	1	4
TUNGURAHUA	2	3	5
ZAMORA		1	1
<b>Total general</b>	<b>71</b>	<b>52</b>	<b>123</b>



El 57,72% (71 casos) se presentan en pacientes cuyos domicilios están en lugares urbanos, y el 42,28% (52 casos) ocurren en pacientes que viven en lugares rurales.

### Porcentaje de Muertes Maternas por lugar de ocurrencia SE 1 a la SE 47



#### donde ocurre la MM


- DOMICILIO
- H. PRIVADO
- H. PUBLICO
- JUNTA DE BENEFICE..
- RPIS
- TRASLADO

### Casos de Muerte Materna por lugar de ocurrencia SE 1 a la SE 47

Provincia de fall..	H. PUB..	DOMIC..	JUNTA..	RPIS	H. PRI..	TRASL..	Total g..
GUAYAS	13	3	15	4	3	1	39
AZUAY	3	2		1	1		7
BOLIVAR	1	1				1	3
CARCHI	1						1
CHIMBORAZO	1	1					2
COTOPAXI	1	1				1	3
EL ORO	6	1		1			8
ESMERALDAS	10	1					11
IMBABURA	1			1		1	3
LOJA	2			1			3
MANABI	9	1		1			11
MORONA	3	1					4
ORELLANA	1						1
PICHINCHA	7	3		4	1		15
SANTA ELENA	2						2
SANTO DOMING..	4						4
TUNGURAHUA	5	1					6
<b>Total general</b>	<b>70</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>123</b>

Hasta la SE 47 del 2016 el mayor porcentaje de MM ocurren en los hospitales públicos 56,91% (70 casos); el 13,01% (16 casos) ocurren en los domicilios; el 12,20% (15 casos) ocurre en los hospitales de la Junta de Beneficencia; el 10,57% (13 casos) ocurren en la RPIS; el 4,07% (5 casos) ocurre en los hospitales privados; el 3,25% (4 casos) ocurren en el momento del traslado.

### Nº de casos de MM por período de ocurrencia SE 1 a la SE 47



### Nº de casos de MM por período de ocurrencia en provincias SE 1 a la SE 47

Provincia de fall..	Post parto	Embarazo	Puerperio+ d..	Parto	Total general
AZUAY	4	3			7
BOLIVAR	3				3
CARCHI	1				1
CHIMBORAZO	2				2
COTOPAXI	1	2			3
EL ORO	5		3		8
ESMERALDAS	7	4			11
GUAYAS	27	8	4		39
IMBABURA	2	1			3
LOJA	2			1	3
MANABI	7	3	1		11
MORONA	4				4
ORELLANA	1				1
PICHINCHA	14	1			15
SANTA ELENA	2				2
SANTO DOMING..	4				4
TUNGURAHUA	4		2		6
<b>Total general</b>	<b>90</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>123</b>

Hasta la SE 47, el 73,17% (90 casos) de las MM notificadas ocurren en el momento del puerperio; el 17,87% (22 casos) ocurren en el embarazo; el 8,13% (10 casos) ocurre en el puerperio tardío más de 42 días luego del post parto; el 0,81% (1 caso) ocurre en el momento del parto.


**N° de casos de MM por zona, provincia y hospital de fallecimiento  
SE 1 a la SE 47**

ZONA 1	CARCHI	H. PUBLICO	H. LUIS GABRIEL DAVILA	1	
		ESMERALDAS	DOMICILIO	NA	1
			H. PUBLICO	CS LA Y DE LA LAGUNA	1
	IMBABURA	H. PUBLICO	H. ALBERTO BUFFONI	1	
			H. DELFINA TORRES	8	
		H. PUBLICO	H. SAN VICENTE DE PAUL	1	
RPIS		H. IESS DE IBARRA	1		
	TRASLADO	NA	1		
ZONA 2	ORELLANA	H. PUBLICO	H. FRANCISCO DE ORELLANA	1	
	PICHINCHA	DOMICILIO	NA	1	
ZONA 3	CHIMBORAZO	DOMICILIO	NA	1	
		H. PUBLICO	H. DOCENTE RIOBAMBA	1	
	COTOPAXI	DOMICILIO	NA	1	
		H. PUBLICO	H. GENERAL DE LATACUNGA	1	
		TRASLADO	NA	1	
	TUNGURAHUA	DOMICILIO	NA	1	
		H. PUBLICO	H. DOCENTE AMBATO	5	
ZONA 4	MANABI	DOMICILIO	NA	1	
		H. PUBLICO	H. NAPOLEON DAVILA	1	
			H. PICHINCHA	1	
			H. RODRIGUEZ ZAMBRANO	3	
			H. VERDI CEVALLOS	4	
		RPIS	H. IESS DE PORTOVIEJO	1	
	SANTO DOMI..	H. PUBLICO	H. GUSTAVO DOMINGUEZ	4	
ZONA 5	BOLIVAR	DOMICILIO	NA	1	
		H. PUBLICO	H. ALFREDO NOBOA	1	
		TRASLADO	NA	1	
	GUAYAS	H. PUBLICO	H. LEON BECERRA	2	
		RPIS	H. IESS DE MILAGRO	1	
		TRASLADO	NA	1	
	SANTA ELENA	H. PUBLICO	H. LIBORIO PANCHANA	2	
ZONA 6	AZUAY	DOMICILIO	NA	2	
		H. PRIVADO	CLINICA SANTA INES	1	
		H. PUBLICO	H. MORENO VASQUEZ	1	
			H. VICENTE CORRAL	2	
		RPIS	H. IESS DE AZUAY	1	
		MORONA	DOMICILIO	NA	1
		H. PUBLICO	H. BASICO DE SUCUA	1	
			H. BASICO MISEREOR	1	
			PS TUKUP	1	
ZONA 7	EL ORO	DOMICILIO	NA	1	
		H. PUBLICO	H. SAN VICENTE DE PAUL	1	
			H. TEOFILLO DAVILA	5	
		RPIS	H. IESS DE MACHALA	1	
	LOJA	H. PUBLICO	H. ISIDRO AYORA	2	
		RPIS	H. IESS DE LOJA	1	
ZONA 8	GUAYAS	DOMICILIO	NA	3	
		H. PRIVADO	CLINICA KENNEDY	1	
			CLINICA SUR HOSPITAL	1	
			OMNI HOSPITAL	1	
		H. PUBLICO	H. ABEL GILBERT PONTON	8	
			H. NEUMOLOGICO	2	
			H. UNIVERSITARIO	1	
		JUNTA DE BE NEFICENCIA	H. ALFREDO PAULSON	3	
			H. ENRIQUE SOTOMAYOR	8	
			H. LUIS VERNAZA	4	
	RPIS	H. IESS DE GUAYAS	3		
ZONA 9	PICHINCHA	DOMICILIO	NA	2	
		H. PRIVADO	H. INGLES	1	
		H. PUBLICO	H. DOCENTE DE CALDERON	1	
			H. ENRIQUE GARCES	3	
			H. G. O. I. A	2	
			H. PABLO ARTURO SUAREZ	1	
		RPIS	H. IESS DE QUITO	3	
		H. POLICIA NACIONAL N°1	1		
Total general				123	


De los 35 casos de MM reportados por la zona 8, 18 fallecen en hospitales privados y de la Junta de Beneficencia; 11 fallecen en hospitales públicos, 3 en el domicilio y 3 casos en la RPIS. Los 15 casos de MM reportados por la zona 1, los 12 fallecen en hospitales públicos 1 caso fallece en la RPIS y 2 casos en el traslado. Los 15 casos de MM reportados por la zona 4, los 13 fallecen en hospitales públicos, 1 caso en la RPIS, 1 caso en domicilio. Los 14 casos de MM reportados por la zona 9, los 7 fallecen en hospitales públicos, 1 en hospital privado, 4 casos en la RPIS, y 2 casos fallecen en el domicilio. Los 11 casos de MM reportados por la zona 6, los 6 fallecen en hospitales públicos y 3 casos en domicilios.



### Porcentaje de Causa Básica de MM a nivel nacional SE 1 a la SE 47



### Causa Básica de MM por zonas de fallecimiento SE 1 a la SE 47




#### Causa Basica De Defun..



Hasta la SE 47 las causas básicas a nivel nacional corresponde al 31,71% (39 casos) a muertes Indirectas, el 25,20% (31 casos) a enfermedades hipertensivas, el 21,14% (26 casos) a muertes por hemorragias, el 9,76% (12 casos) a muertes por sepsis, el 7,32% (9 casos) a muertes por otras causas, el 4,88% (6 casos) a abortos.

### Porcentaje de nivel de instrucción al momento de fallecimiento SE 1 a la SE 47




### Nº de casos por nivel de instrucción SE 1 a la SE 47

Primaria	48
Secundaria	31
Bachillerato	16
Superior	12
Edu. Básica	11
Ninguna	5
Total general	123


El 39,02% (48 casos) de las madres fallecidas su nivel de instrucción fue primaria; el 25,20% (31 casos) su nivel de instrucción fue secundaria; el 13,01% (16 casos) su nivel de instrucción fue bachillerato; el 9,76% (12 casos) el nivel de instrucción fue superior, el 8,94% (11 casos) su nivel de instrucción fue básica; el 4,07% (6 casos) no tienen ninguna instrucción.

### Grupo étnico correspondiente a las MM SE 1 a la SE 47




El 85,37% (105 casos) se definen en el grupo étnico mestiza, el 9,76% (12 casos) se definen como indígenas, el 4,07% (5 casos) se definen como afroecuatorianas el 0,81% (1 caso) se define como montubia.

### Número de casos de MM por Demoras SE 1 a la SE 47




De los 123 casos de MM reportados hasta la SE 47, el 60,96% (75 casos) tienen el Informe Final con datos de las demoras, de estos el 58,33% (42 casos) son MM con la tercera demora que corresponde al acceso a una atención oportuna a los Servicios de Salud; el 11,11% (8 casos) corresponden a la primera demora que es la falta de reconocimiento de los signos de peligro para buscar ayuda oportuna, el 15,27% (11 casos) corresponden a la primera y tercera demora; el 8% (6 casos) corresponden a la segunda y tercera demora siendo la segunda demora dada por el desconocimiento sobre donde acudir por ayuda, problemas de transporte, problemas económicos y falta de poder de decisión de la mujer sobre su propia salud; el 4% (3 casos) se concluyó que no había demora.

### Número de casos de MM con controles prenatales SE 1 a la SE 47




El 60,96% (75 casos) tuvieron controles prenatales, el 8,94% (11 casos) no tuvieron controles prenatales y el 30,08% (38 casos) entre NULOS y NO SABEN aún no se define pues están en proceso de investigación.

### Número de controles prenatales SE 1 a la SE 47




De los 75 casos que si tuvieron sus controles prenatales, el 9,33% (7 casos) tuvieron al menos un control prenatal, el 24% (18 casos) tuvieron cinco controles prenatales que corresponde al número de controles mínimos que se debe tener según la norma técnica, 10,67% (8 casos) tuvieron 9, 10, 13, 15 y 19 controles prenatales.

### Número de Muertes Maternas por Tipo de Parto SE 1 a la SE 47




De las 124 MM reportadas hasta la SE 47, el 52,03% (64 casos) fue por Cesáreas; el 22,75% (28 casos) fueron partos vaginales; el 16,26% (20 casos) fallecieron cuando se encontraban en el embarazo; 8,94% (11 casos) se practicaron legrados por aborto.

### Estado del niño al nacimiento SE 1 a la SE 47



De las 64 MM que se realizaron bajo Cesáreas, el 81,25% (52 niños) vivieron; el 18,75% (12 niños) fallecieron. De las 28 MM que fueron por Parto Vaginal, el 78,57% (22 niños) vivieron; el 21,43% (6 niños) fallecieron. Se concluye que de las 92 MM que su parto fue por Cesárea o por vía vaginal 80,43% (74 niños) vivieron y se encuentran en custodia del padre y de familiares, y el 19,57% (18 niños) fallecieron.

### \*Tasa de MM por 10.000 embarazadas. Ecuador 2016 SE 1 a la SE 47



\*La tasa de MM de cada una de las provincias está calculada por: Número de MM ocurridas en cada una de las provincias hasta la SE 47 dividida para la proyección de embarazadas del 2016 y multiplicada por 10.000.

La provincia de Esmeraldas registra una Tasa del 7,67 es decir que por cada 10.000 embarazadas de esta provincia aproximadamente 8 están en riesgo de fallecer, le sigue Morona con una tasa de 6,5 es decir que por cada 10.000 embarazadas de esta provincia aproximadamente 7 están en riesgo de fallecer.

La SE 47 va del 20 de noviembre al 26 de noviembre del 2016  
Los datos reportados del año 2016 son las notificaciones sistemáticas desde los establecimientos de salud; se incluye 5 MM de la BA. Los casos de MM de los años 2012 al 2015 son los totales..

Elaborado por: Raquel Lovato Silva /Analista DNVE  
Revisado y aprobado por: Mgs. Ligia Luna / Directora DNVE  
Fecha: 01 de diciembre del 2016